

Partifecske, gyurgyalag telepen való gyűrés általános szabályai

A Madárgyűrés Központ szabályzatai 2018., 24. oldal,
http://www.mme.hu/sites/default/files/binary_uploads/6_termeszetvedelem/madargyuruzesi_kozpont/madargyuruzesi_kozpont_szabalyzatai.pdf

A gyűrészt a fiókaetelési időszakban (a fészkelő üregekben hallhatóak a fiókák, illetve a partfal előtt a talajon a szülő madarak által kihordott ürülékcsoportok találhatóak nagy számban) javasolt végezni a reggeli és délutáni időszakban. Az azt megelőző üregásai (frissen kiásott talaj nagy mennyiségben a partfal alatt), tojásrakási (számos egymáshoz szorosan repülő madár a levegőben) és kotlási (az üregek bejáratán látszik, hogy már nem ássák, de használják, nem hallatszik fiókák hangja, kevés fecske látható a telepen) időszakban kerülni kell a gyűrészt.

Egy telepen egyszerre egy db 12 m-nél hosszabb (maximum 24 m) hálót csak akkor lehet használni, ha a háló mögötti partfalon az üregek száma 200-nál kevesebb és legalább 3 fő gyakorlott madárszedő áll a rendelkezésre, mert csak így biztosítható a befogott madaraknak a befogástól számított maximum egy órán belüli gyűrése és elengedése.

A hálót maximum 1-1,5 órán keresztül szabad folyamatosan széthúzva tartani a partfal előtt, amelyet minimum 1- 1,5 órányi összehúzás után lehet ismét szétnyitni. Egy teljes nap során maximum 4-5 alkalommal lehet széthúzni a hálót adott teleprészlet előtt.

A hálókat gyakran (5-10 percenként) kell ellenőrizni, amennyiben a partfal erős napsugárzásnak és magas hőmérsékletnek (28 C) van kitéve, amennyiben erős szél, illetve intenzív csapadék éri, a hálót össze kell húzni.

A partfal elé kihúzott hálót települések közelében folyamatosan szemmel kell tartani az emlős ragadozók (macskák, kutyák) kontrollálása érdekében, a telep környékén feltűnő ragadozót el kell riasztani, illetve a hálót össze kell húzni, ha a ragadozó távoltartása nem megoldható.